

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

(ARDENNES, AUBE, MARNE, HAUTE-MARNE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

62, Avenue Nationale, La Neuville, B.P. 1154, 51056 Reims Cedex, Tél. 09.06.43-

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP - 4-7-843

ÉDITION A ou B : 95 F

ÉDITION A + B : 160 F

BULLETIN N° 17 du 28 Juin 1984

ÉDITION GRANDES CULTURES

Envoi n° 15

**BLE d'HIVER** : pucerons à surveiller uniquement sur variétés tardives.

**POIS** : peu de tordeuses, apparition du botrytis.

**POMME DE TERRE** : premières taches de mildiou en culture.

## BLE D'HIVER

**Pucerons des épis** : Les pluies orageuses et les auxiliaires limitent sérieusement l'évolution des populations.

Localement, quelques parcelles atteignent le seuil de traitement (1 épi sur 2 porteur de puceron).

Surveillez jusqu'en fin de semaine prochaine les variétés tardives.

Les interventions peuvent se justifier jusqu'au stade "grain pâteux".

N'utilisez que des spécialités respectant les auxiliaires (par exemple Pirimor G).

**Cnephasia** : Attaques parfois sérieuses lorsque la protection a été négligée. Il est trop tard pour intervenir même en rattrapage.

La présence de ce ravageur dans une zone est l'indice d'un risque sérieux pour la campagne à venir.

## POIS DE PRINTEMPS

**Tordeuses** : Les captures sont très faibles.

Ne sont à protéger que les parcelles situées dans des secteurs où le pois est cultivé depuis plus de 4 à 5 ans.

**Maladies** : Anthracnose rare. Le Botrytis apparaît à la suite des récents orages sur les cultures denses et adossées.

En cas d'évolution, intervenez avec des produits de contact ou des spécialités de type BTF, Cereclair, Bravo plus...

## POMME DE TERRE

Premières taches de mildiou observées en culture.

L'arrivée d'une période orageuse est annoncée dans les prochains jours. Il convient donc de rester très prudent.

Renouveler les traitements sur les parcelles arrivant en fin de protection.

## M A I S

**Pyrale** : Sortie des premiers papillons en cage d'élevage.

Les traitements ne seront vraisemblablement pas à réaliser avant le 14 juillet (retard de végétation et vols tardifs).

## LUZERNE

Sur cultures ayant subi la 1ère coupe, parfois présence de chenilles vertes défoliatrices. Ce sont des larves de phytonomes.

Les infestations sérieuses sont actuellement rares. La meilleure méthode de lutte consiste à avancer la date de la 2ème coupe. Évitez toute application d'insecticide (problèmes de résidus).

## BETTERAVES

La plupart des cultures couvrent le sol ou ont dépassé le stade 8 à 10 feuilles. Il n'y a plus lieu d'intervenir contre les pucerons.

Sur les betteraves qui n'ont pas reçu d'engrais boraté au semis, une application foliaire pourra être réalisée prochainement.

REPONDEUR AVERTISSEMENTS (26) 87.40.78

Imprimerie de la Circonscription Champagne-Ardenne. Le Directeur Gérant J. BOUCHET  
Commission Paritaire de Presse N 529 AD  
(C. SPV 1984) "Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation".

734